

## 1.1. Concetto per il trattamento della varroa

Mese	Misure	Gruppo prontuario		
Febbraio				
Marzo	Inserire telaino per la covata da fuco e rimuovere più volte quella opercolata	Arginare la proliferazione della varroa		
Aprile	Creazione di giovani colonie/nuclei			
Maggio	Contare la caduta naturale della varroa Se più di 3 acari al giorno → trattamento d'urgenza	Diagnostica della varroa/Trattamento d'urgenza		
Giugno	Rimozione favo da fuco/Creazione di giovani colonie/nuclei	Arginare la proliferazione della varroa		
Luglio	Contare la caduta naturale della varroa Se più di 10 acari al giorno → Trattamento d'urgenza o trattamento estivo immediato (con o senza acido formico)	Diagnostica della varroa/Trattamento d'urgenza o estivo		
	1° trattamento estivo a scelta <u>senza o con</u> acido formico	Iniziare 1° metà di luglio	Senza acido formico (Blocco della covata, Metodo del telaino trappola o Asportazione totale della covata)	Altri metodi di trattamento
		o		
Agosto		Iniziare entro la fine di luglio	Con acido formico	Trattamento estivo
Settembre	2° trattamento estivo	Iniziare al più tardi a metà sett.	Sempre con acido formico	Trattamento estivo
Ottobre	Contare la caduta naturale della varroa Se più di 5 acari al giorno → trattamento immediato con acido ossalico	Diagnostica della varroa		
Novembre				
Dicembre	Trattamento con acido ossalico <u>in assenza di covata</u>	Trattamento invernale		
Gennaio	Contare la caduta dovuta al trattamento Se durante le 2 settimane dopo il trattamento invernale più di 500 acari sul fondo → ripetere trattamento invernale (nebulizzazione o evaporazione)	Diagnostica della varroa/Trattamento invernale		

Arginare la proliferazione della varroa

Valutare l'infestazione della varroa

Trattare