

1.2.5. Strisce impregnate di acido formico (Formicpro)

Particolarità:

Medicamento veterinario registrato (successore di MAQS), pronto all'uso per un'applicazione semplice nelle colonie con almeno 10.000 api.

Se i risultati differiscono da quelli indicati nelle istruzioni d'uso, si prega di informare Swissmedic (in tedesco: www.vetvigilance.ch/meldungen.html, in francese: www.vetvigilance.ch/meldung_F.html).

Misure di protezione:

Le strisce sono impregnate di acido formico, che, anche in forma non liquida, è estremamente caustico. Bisogna manipolarle con la massima prudenza. In ogni caso, indossare guanti di gomma resistenti agli acidi, occhiali protettivi e indumenti a maniche lunghe. È inoltre necessario disporre di acqua per un risciacquo completo dopo un eventuale contatto con la pelle o con gli occhi. Aprire la confezione unicamente all'aria aperta e non inalarne i vapori. Se è inevitabile lavorare in uno spazio chiuso, è necessario indossare una maschera.

Materiale necessario:

- Strisce Formicpro ad us. vet (Andermatt BioVet AG)
- Forbici (per aprire la confezione contenente le due strisce)
- Guanti resistenti agli acidi, occhiali protettivi ed eventualmente una maschera (tipo B o E)
- Secchio pieno d'acqua

Punti importanti:

- Primo trattamento prima di fine luglio (dopo il raccolto del miele), secondo trattamento: iniziare al più tardi a metà settembre. Secondo il concetto varroa, il SSA raccomanda di effettuare entrambi i trattamenti estivi.

- Non lasciare spazi vuoti sopra le strisce (nelle arnie svizzere, coprire direttamente con il coprifavo).
- Non danneggiare o tagliare l'involucro delle singole strisce.
- Collocare le strisce nelle colonie di preferenza il mattino presto quando fa ancora fresco.
- Adatto ad arnie magazzino con almeno 5 o ad arnie svizzere con almeno 6 favi completamente occupati dalle api.
- Contrariamente a quanto indicato sulle istruzioni d'uso, per facilitare il controllo delle colonie, le strisce devono essere rimosse al termine del trattamento. Le strisce usate vanno smaltite in modo adeguato.
- Al momento del trattamento, le colonie devono disporre di nutrimento non opercolato.
- Durante il trattamento, non nutrire né disturbare le colonie.
- Per ottimizzare l'efficacia, i fondi grigliati devono essere chiusi alcuni giorni prima e durante il trattamento.


Procedimento:

- Indossare il dispositivo di protezione
- Aprire al massimo le aperture di volo
- Collocare le strisce impregnate direttamente sui listelli dei telaini. Nelle arnie svizzere, coprire le strisce con le tavolette coprifavo (senza spazio di evaporazione), in quelle magazzino direttamente con il coprifavo.
- Utilizzare il prodotto conformemente alle [istruzioni d'uso](#). Le avvertenze per una corretta somministrazione devono essere rispettate rigorosamente. Eccezione: rimuovere le strisce utilizzate dopo il trattamento.

Arnia magazzino


Con un corpo per il nido, a favo freddo

- ➡ per altri tipi di arnie magazzino, cfr. le istruzioni d'uso



Arnia svizzera

Non lasciare dello spazio libero sopra i telaini



Link alle [istruzioni d'uso Formicpro](#) e al [flyer BioVet](#) (in tedesco)